

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialis

V


(22 Octobre 1941)

MOULINS

"LES IMPRIMERIES RÉUNIES"

15, RUE D'ENGHIEN, 15





SciELO/MZUSP

Le présent fascicule contient, pour commencer, une série de *Clerides* de Madagascar, en partie de la collection Sicard, et dont les *types* sont au Muséum de Paris. Pour réduire l'impression, je ne cite pas les localités et donne des descriptions abrégées. Quand je possède les espèces décrites, j'ajoute la mention : aussi c. Pic et pour celles de ma collection seule : in c. Pic. Après les *Clerides*, se terminant au genre inclus *Patuleius* F., les *types* des nouveautés, de diverses familles, se trouvent dans ma collection.

***Pseudopallenis preapicalis* n. sp.** Angustatus, subopacus, pro parte dense griseo pubescens, niger, elytris ad medium anguste oblique luteo et albo fasciatis, membris nigris ; thorace elongato, lateraliter sinuato, minute et dense granuloso ; scutello fere glabro ; elytris ad basin paulo gibbulosis, antice minute lineato-punctatis, postice densissime et minute granulosis aut punctatis, ante apicem distincte griseo maculatis ; pedibus gracilibus, posticis longioribus. Long. 10 mill. — Cette gracieuse espèce est plus gracile que *P. interrupta* Pic, ayant une large bande complète et oblique, au lieu de 2 macules juxtaposées, avec les pattes plus grêles.

***Liostylus convexicollis* n. sp.** Angustatus, nitidus, niger, elytris ante medium externe minute rufo notatis, antennis testaceis, his elongatis, gracilibus, articulis tribus ultimis distincte latoribus et elongatis ; thorace longissimo, antice supra arcuate convexo, sparse punctato ; elytris elongatis, ad medium paulo depressis, usque ad apicem minute lineato-punctatis, apice breve rufo marginatis. Long. 4 mill. — Espèce très caractérisée par son thorax très long, nettement surélevé au milieu conjointement à ses élytres brièvement marqués de roux.

***L. cyaneipennis* n. sp.** Elongatus, nitidus, rufus, elytris cyaneo-metallicis, ad medium albofasciatis, infra cor-



pore pedibusque pro majore parte nigris ; antennis gracilibus et elongatis, articulis penultimis transversis, ultimo cylindrico et depresso, longissimo ; thorace elongato, medio sulcato et sparse punctato, lateraliter multiplicato ; elytris elongatis, antice fortiter lineato punctatis, postice minute et irregulariter punctatis. Long. 5 mill. (Aussi c. Pic). — A cause de son dernier article des antennes très grand et aplati, je crois devoir classer cette nouveauté dans un s. g. nouveau que je nomme *Tilloliostylus*.

Liostylus basicollis n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris ad medium luteo arcuate fasciatis, thorace postice lateraliter luteo notato, membris pro parte testaceis ; capite antice brunnescente, antennis apice paulo latioribus ; thorace elongato, minute parum dense punctato ; elytris ad medium paulo depressis, antice fortiter lineato punctatis, postice pro parte substriatis, minute et sparse punctatis, pedibus testaceis, femoribus apice nigris, anticis diverse nigris. Long. 4 mill. (aussi c. Pic). — Voisin de *longipennis* Pic, s'en distingue facilement par les élytres moins longs, foncés à l'extrémité.

L. rufohumeralis n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice, thorace antice membrisque pro parte rufis, elytris rufis, medio late nigro-piceis, ad medium testaceo-albo subarcuate fasciatis ; clava antennarum 4 articulata, valde distincta ; thorace elongato, sparse punctato, ad basin plicatulo ; elytris elongatis, ad medium paulo depressis, antice paulo gibbulosis, diverse pro parte lineato-punctatis, ad medium et postice sparse punctatis. Long. 4 mill. — Voisin de *4-partitus* Frm., s'en distingue par la ponctuation de la base des élytres en partie oblitérée, les épaules plus nettement marquées, ayant une partie foncée en dessous de la fascie.

L. atricolor n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris metallicis, ad medium paulo depressis, antice minute

lineato punctatis, postice parum punctatis, humeris prominulis, antennis rufis, apice nigris, clava triarticulata, parum lata. Long. 2,5 mill. (in c. Pic). — Voisin de *stricticollis* Frm., s'en distingue, à première vue, par les élytres entièrement foncés.

L. latemaculatus n. sp. Parum elongatus, nitidus, nigro-metallicus, elytris ad medium late luteo maculatis; capite antice rufescente, antennis nigris, ad basin testaceis; thorace elongato, fortiter et sparse, postice densiore punctato; elytris parum elongatis, antice mediocre lineato-punctatis, postice minute et irregulariter punctatis; pectore rufo; pedibus nigris, femoribus anticis pro parte rufis. Long. 3 mill. — Voisin de *stricticollis* Frm., s'en distingue nettement par la grande macule des élytres, ceux-ci moins noirs, à reflets métalliques faiblement bleutés.

L. Sicardi n. sp. Elongatus, nigro-metallicus, elytris cyaneis, antennis testaceis; capite antice rufescente; thorace elongato, minute punctato; elytris elongatis, diverse, postice minute lineato-punctatis; pedibus nigris, pro parte diverse rufis. Long. 2 à 3 mill. (aussi c. Pic). — Très distinct du précédent par la forme plus allongée des élytres et ces organes sans macule claire.

L. semirufus n. sp. Angustatus, nitidus, niger, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis, antennis ad basin et pedibus pro parte rufis; thorace elongato; elytris elongatis, antice substriatis et mediocre lineato-punctatis, postice pro parte substriatis. Long. 2,5 mill. — Distinct, à première vue, du précédent par son avant-corps roux.

L. diversicolor n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, thorace postice brunnescente, elytris ante medium diverse brunneo binotatis et post medium brunneo fasciatis, macula externa et fascia junctis, membris rufis; thorace

elongato, paulo et sparse punctato, ad basin multiplicato; elytris elongatis, substriatis, diverse parum fortiter lineato-punctatis, postice sparse punctatis. Long. 3.4 mill. (aussi c. Pic). — Peut se placer près de *rufo-tinctus* Frm.

Phlæocopus multiplicatus n. sp. Angustatus, nitidus, niger, elytris testaceis, ad basin reducte piceo fasciatis, ante medium in singulo minute nigro maculatis, post medium oblique sinuate piceo fasciatis et intus paulo piceo nebulosis, membris testaceis, femoribus apice et tibiis ad basin nigris; antennis gracilibus, articulo ultimo longissimo; thorace medio impresso, longitudinaliter multiplicato; elytris sat angustatis, ad basin fere ad apicem fortiter lineato punctatis. Long. 14 mill. (in c. Pic). — Caractérisé par ses dessins élytraux particuliers.

P. Sicardi n. sp. Elongatus, subopacus, piceus, elytris rufo-piceis, ad medium, lateraliter postice et apice flavo notatis, membris diverse rufis; antennis gracilibus, articulo ultimo longissimo, apice oblique truncato ♂, sat breve et paulo robusto ♀; thorace medio impresso; scutello albo pubescente; elytris latis, sat elongatis, ad basin ultra medium fortiter lineato punctatis, lineis pro parte reductis, postice pro parte minute punctatis; pedibus robustis, diverse rufis et brunneis. Long. 13-14 mill. (aussi c. Pic). — Voisin de *Perroti* Frm., s'en distingue, à première vue, par la fascie postérieure claire, jointe sur les côtés à la macule apicale.

P. ornatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufus, pro parte piceo-metallico ornatus, elytris post medium oblique albo fasciatis et apice albo notatis, antennis rufis, gracilibus, articulo ultimo longissimo, subarcuato, apice acuminato; thorace elongato, medio breve sulcato; scutello albo pubescente; elytris parum latis, sat elongatis, diverse coloratis, antice fortiter lineato puncta-

tis, postice minute punctatis et multi impressis ; pedibus robustis, rufis, femoribus brunneo notatis. Long. 12 mill. — Voisin du précédent, avec la forme plus étroite, la fascie non jointe à la macule apicale, l'aspect un peu brillant.

P. Alluaudi n. sp. *Elongatus*, parum nitidus, piceus, elytris testaceis, ad scutellum piceo maculatis, ante medium anguste et sinuate, post medium late piceo fasciatis, fascia prima antice et postice lateraliter prolongata, fascia secunda reducta, ante apicem brunneo maculatis, membris pro parte rufis ; antennis rufis, articulo ultimo parum elongato ; thorace piceo, antice rufo notato, supra inæquale, medio impresso et reducte plicato, externe longe plicato ; elytris parum latis, postice paulo latioribus, ad basin et ad medium externe lineato punctatis, postice striatis aut diverse impressis ; pedibus parum gracilibus, rufis, femoribus brunneo notatis. Long. 10 mill. — Espèce caractérisée par la structure du thorax, les dessins fasciés et maculés des élytres ; peut se placer près de *Opilo strigicollis* Sch., qui rentrerait dans le genre *Phloeocopus* Guer.

Opilo atricolor n. sp. Parum latus, paulo pubescens, nitidus, niger, elytris post medium externe arcuate sinuate luteo fasciatis, longe lineato punctatis ; thorace ad medium sparse pupillato-punctato. Long. 8 mill. (in c. Pic). — A placer près de *tristis* Kl.

Myrmecomea angustefasciata n. sp. *Elongatus*, parum nitidus, niger, elytris ad humeros vage rufis, postice lateraliter breve flavo marginatis, oblique et paulo luteo notatis, anguste eburneo fasciatis, antennis pro parte pedibusque rufescentibus ; thorace parum breve et mediocre robusto, postice strangulato, medio dense granuloso punctato ; elytris post medium paulo strangulatis, sed distincte depressis, postice paulo convexis, diverse punc-

tatis. Long. 5 mill. (in c. Pic). — Peut se placer près de *densaticollis* Frm.

M. bipartita n. sp. Minutus, parum elongatus, paulo pubescens, paulo et minute punctatus, nitidus, nigro metallicus aut piceus, elytris ad humeros paulo et apice late testaceis, antennis abdomine pedibusque testaceis, elytris in singulo externe subarcuate eburneo fasciatis. Long. 3-4 mill. (aussi c. Pic). — Peut se placer près de *apicata* Frm.

M. luteofasciata n. sp. Oblongus, parum nitidus, elytris antice et interne fulvo pubescentibus, niger, elytris ad medium triangulariter luteo fasciatis et anguste oblique eburneo fasciatis ; thorace medio globuloso, pro majeure parte granuloso-punctato ; elytris latis, sat brevibus, ad medium paulo strangulatis et depressis, antice fortiter pro parte regulariter, postice minute et irregulariter, punctatis. Long. 8 mill. — Peut se placer près de *fulvosemata* Frm.

M. Sicardi n. sp. Minutus, elongatus, nitidus, niger, elytris post medium arcuate eburneo fasciatis, fascia ad suturam interrupta, epistome, labro, antennis ad basin et apice rufis ; thorace parum elongato, ad medium latiore, mediocre et sparse punctato ; elytris parum elongatis, post medium paulo strangulatis et depressis, antice fortiter et dense punctatis, postice pro parte lineato punctatis. Long. 4 mill. — Peut se placer près de *bipartita* Pic, mais élytres à fond complètement foncé.

M. minuta n. sp. Minutus, elongatus, nitidus, niger, elytris ad medium externe minute luteo maculatis et marginatis, oblique eburneo fasciatis, fascia interrupta, capite antice, antennis pedibusque pro parte rufo-testaceis ; thorace parum elongato, antice sat lato, mediocre granuloso punctato, antice medio læve ; elytris parum elon-



gatis, ad medium paulo strangulatis et depressis, apice paulo convexis, ad basin fortiter lineato-punctatis, ad medium fere impunctatis, apice diverse punctatis, supra ante apicem late foveolatis, fovea densiore punctata. Long. 4 mill. — A placer près de *bigibbula* Fm.

?Eburiphora viridesuturalis n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus aut testaceus, capite postice et thorace medio viride vittatis, elytris testaceis, ad suturam, apice excepto, viride vittatis, pectore viride notato, membris testaceis ; oculis paulo prominulis ; antennis gracilibus, articulis tribus ultimis paulo latioribus ; thorace parum breve, antice et postice strangulato, ad medium subarcuato, pro parte fortiter et irregulariter punctato ; elytris thorace distincte latioribus, elongatis, substriatis, usque fere ad apicem, lineato, pro parte fortiter, punctatis ; pedibus sat brevibus. Long. 6 mill. — Espèce douteuse pour le genre, très caractérisée par sa particulière coloration, avec la bande verte suturale se prolongeant sur le milieu du thorax et le vertex.

Eburiphora robusticollis n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, elytris ad medium eburneo fasciatis, fascia lateraliter dilatata, ad suturam interrupta, apice luteo pilosis ; capite thoraceque robustis, latis, illo postice strangulato, sparse granuloso punctato ; elytris ad medium paulo strangulatis, ad basin fortiter lineato punctatis, medio paulo punctatis, postice dense punctatis et subcostulatis ; femoribus anticis valde dilatatis, posticis, elongatis et angustatis. Long. 8 mill. (in c. Pic). — Espèce caractérisée par la forme robuste de l'avant-corps, les grosses cuisses antérieures.

E. eburneofasciata n. sp. (in c. Pic). De coloration noire analogue au précédent, ayant une fascie éburnée plus droite, les élytres subopaques, plus longs, subparallèles, à pubescence apicale grise, le thorax est peu ro-

buste, densément granuleux, les cuisses antérieures sont moins épaisses et les postérieures plus courtes.


E. diversipennis n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, elytris luteis ad basin late et apice breve cyaneis, ad medium in singulo albo maculatis et reducte eburneo fasciatis, postice reducte eburneo fasciatis ; infra corpore membrisque bicoloribus. Long. 8 mill. (aussi c. Pic). — Ressemble à *trinotata* Pic, moins robuste, avec les élytres marqués largement de clair et la fascie postérieure plus éloignée de l'antérieure.

E. semirufa n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufus, membris pro parte brunneis, pectore nigro, elytris cyaneo-violaceis, in singulo ante et post medium albo maculatis. Long. 7 mill. (aussi c. Pic). — Très distinct du précédent par les élytres ornés seulement de deux macules lisses blanches.

E. griseoapicalis n. sp. Elongatus, nitidus, albo pubescens, apice densiore et fusco hirsutus, nigro-cyaneus, elytris ad medium externe eburneo fasciatis, membris diverse testaceis. Long. 5,5-6 mill. (aussi c. Pic). — A placer près de *unisignata* Pic.

E. unimaculata n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-metallicus, elytris cyaneis, in singulo externe post medium albo maculatis, scutello albo, epistome, labro, antennis et femoribus ad basin late rufis ; thorace parum elongato, antice dilatato, diverse, pro parte sparse et fortiter punctato ; elytris elongatis, antice fortiter lineato, punctatis, postice minus fortiter punctatis et apice irregulariter punctatis. Long. 9 mill. — A placer près de *unisignata* Pic.

E. angustipennis n. sp. Angustatus, apice valde attenuatus, nitidus, viride cœruleis, labro, palpis, antennis et pedibus pro majore parte testaceis ; thorace parum elon-



gato, antice sat lato, postice strangulato, pro parte fortiter et sparse punctato; elytris elongatis et angustatis, apice separate attenuatis, fortiter lineato punctatis, apice fortiter et irregulariter punctatis. Long. 8 mill. (in c. Pic). — Espèce bien caractérisée par sa forme élytrale, ces organes étant un peu acuminés et sans tache éburnée.

E. semirufa (nov.). De forme et sculpture analogues au précédent, mais avec l'avant-corps roux et les pattes un peu plus claires. Long. 9 mill. — Sans doute var. de *angustipennis* mihi.


E. acuminata n. sp. Même forme et coloration analogue à *angustipennis* avec le dessus vert métallique et les membres largement roux, distinct par la présence de deux gouttes blanches sur les côtés de chaque élytre, la postérieure étant plus près du bord. Long. 8-8,5 mill. (aussi c. Pic).

E. subacuminata n. sp., voisin du précédent, est vert sur l'avant-corps, vert bleu sur les élytres, les pattes sont foncées, les élytres plus prolongés à l'apex, cependant non pointus, les taches guttiformes sont plus marquées. Long. 10 mill.

Evenus Perrieri v. nov. *humeralis*. Elytris ad humeros nigro maculatis (in c. Pic).

Rhopaloclerus vittatus n. sp. Angustatus, nitidus, viride metallicus, elytris luteis, ad suturam et externe piceo-æneo vittatis, membris testaceis, clava antennarum nigra, illa parum lata, sat elongata; oculis grandis, prominulis; scutello griseo pubescente; pedibus gracilibus. Long. 3 mill. — Cette espèce, de forme étroite et allongée, se reconnaît entre toutes par la présence des bandes métalliques sur les élytres.

Patuleius granulicollis n. sp. Oblongus, antice et pos-



tice attenuatus, nitidus, rufo-purpureus, antennis nigris, tibiis et tarsis anticis piceis ; clava antennarum lata, thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, postice lateraliter longe sulcato, antice et medio minute punctato, externe medio dense granuloso ; elytris lateraliter antice paulo compressis et late marginatis, diverse irregulariter, in disco pro parte lineato punctatis. Long. 4 mill. — Voisin de *inapicalis* Pic avec les élytres à rangées de points rapprochés (avec traces de stries), plus régulières et surtout par les granules et le sillon du thorax. La présence de ce sillon au thorax m'autorise à créer le s. g. **Sulcopatuleius**.

Glipa andamana n. sp. [Hét.]. Elongatus, niger, pro parte iridescens, elytris ad basin griseo undulato-fasciatis, ad medium anguste fasciatis, fasciis pro parte junctis, ante apicem transverse griseo fasciatis. Long. 6 mill. Iles Andaman. — Voisin de *subsinnuata* Pic, dessins gris médians particuliers.

G. diversepubens n. sp. Elongatus, pro parte griseo aut luteo pubescens, nigro-metallicus, elytris ad basin arcuate luteo fasciatis, fascia intus et supra prolongata, post medium oblique griseo fasciatis. Long. 7 mill. Bornéo. — Voisin du précédent, dessins des élytres différents.

G. nigronotata n. sp. Elongatus, pro parte griseo pubescens, nigro iridescens, thorace signaturis tribus glabris ornato, elytris ad humeros luteo pubescentibus, antice et intus longitudinaliter sinuate et griseo lineatis, ad medium et ante apicem, externe excepto, griseo fasciatis, sutura pro parte grisea. Long. 7 mill. Tonkin. — Espèce caractérisée par la présence, sur chaque élytre, d'une macule prescutellaire glabre incluse dans la partie pubescente.

G. subsinnuata v. n. **bicoloripes**. Femoribus anticis testaceis. Cayenne.

G. formosana Pic. Varie beaucoup ; sont à distinguer les formes nouvelles suivantes : élytres diversement roux, soit avec la fascie médiane grise nette prolongée anguleusement en arrière avec une bordure apicale grise remontant sur la suture (*v. apicepubens*), soit ayant la fascie médiane subarquée avec l'apex un peu pubescent de gris jaune (*v. subpubens*).

Xenogena grandis n. sp. [Hét.]. Elongatus, nitidus, longe pubescens, rufo-testaceus, elytris pallidioribus, pedibus pro parte et abdomine apice brunneis, antennis nigris, ad basin rufis, articulis 3 et sequentibus elongatis, ultimo parum elongato, acuminato, capite thoraceque diverse dense punctatis ; elytris striato-punctatis, intervallis multi punctatis. Long. 8 mill. Erythrée. — Diffère de *cochliophora* Br. par la coloration plus claire et le dernier article des antennes un peu plus court.

X. longicornis n. sp., du Congo, analogue au précédent par la coloration et les antennes à articles allongés, mais avec le dernier article plus long, avant-corps moins robuste, thorax moins large, intervalles plus étroits.

X. Auberti n. sp., du Gabon, également de coloration analogue, a les antennes nettement élargies à l'extrémité avec le dernier article modérément long et épais, la ponctuation des stries est moins régulière. Long. 6 mill.

X. Alluaudi n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, pubescens, rufus, capite postice paulo brunnescente, membris brunneis, femoribus ad basin rufis, antennis nigris, ad basin rufis, articulis intermediis sat brevibus aut deplanatis, ultimo breve, apice truncato ; capite thoraceque sat dense punctatis ; elytris striato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 5 mill. Assinie. — Plus allongé que *Crampeli* Pic avec les antennes différentes.

X. leonea n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, pubes-

cens, rufus, capite, thorace pro majore parte, antennis, pedibus, femoribus ad basin exceptis abdomineque late nigris ; antennis sat brevibus, parum crassis, articulo ultimo breve ; capite thoraceque fortiter sat dense punctatis ; elytris striato-punctatis, intervallis minute punctatis, Long. 5 mill. S. Leone. — Caractérisé par la coloration foncée de l'avant-corps et des antennes.

X. semiobscura n. sp., de S. Leone, voisin du précédent avec l'avant-corps d'un rouge brun et la base des antennes un peu roussâtre, a le thorax plus large, la ponctuation des élytres plus forte et la taille plus grande, de 7,5 mill.

X. laticeps n. sp. Oblongus, robustus, nitidus, pubescens, niger, thorace elytrisque rufescentibus ; antennis brevibus et latis ; capite post oculos fere recto ; thorace pro parte fortiter et irregulariter punctato, elytris striato-punctatis, intervallis punctatis et pro parte plicatis. Long. 7 mill. Fort Sibut. — Très caractérisé par sa coloration largement foncée jointe à la forme de la tête.

X. striatipennis n. sp. Oblongus, nitidus, fere glaber, testaceus, capite rufo obscuro, membris pro majore parte nigris aut piceis ; antennis parum crassis, articulo ultimo elongato ; capite thoraceque sat fortiter non dense punctatis ; elytris latis, sat brevibus, postice attenuatis, striato punctatis, intervallis fere impunctatis. Long. 5 mill. Tanganika. — Caractérisé par sa sculpture élytrale avec la pubescence indistincte.

X. Conradi n. sp., de la même origine, est foncé avec le dessus du corps, tête exceptée, testacé, les antennes sont un peu élargies à l'extrémité avec le dernier article court.

X. minor n. sp. Oblongus, nitidus, parum pubescens, testaceus, capite obscuro, antennis rufis, sat graci-

libus, apice fractis ; capite fortiter punctato ; thorace sat minute et sparse punctato ; elytris striato-punctatis, intervallis fere impunctatis. Long. 4 mill. Congo. — Voisin des précédents.

Ectenostoma Perroudi n. sp. [Hét.]. Angustatus, subparallelus, nitidus, sat dense et breve griseo pubescens, testaceus, capite postice et antennis, articulis primis pro parte exceptis, nigris, abdomine apice metallico, elytris viride metallicis. Long. 7 mill. Dahomey. — Ressemble à *angustissima* Pic, s'en distingue, à première vue, par le thorax clair.

E. discicollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, breve, sat sparse griseo pubescens, supra rufescens, thorace in disco paulo metallico, infra corpore nigro metallico ; antennis nigris, robustis ; thorace minute sat dense punctato ; elytris antice paulo depressis, regulariter striatis, intervallis subdepressis, multi punctatis ; pedibus luteis, femoribus apice tarsisque nigris. Long. 9 mill. Dahomey. — Peut se placer près de *cisteloides* Br., qui a une autre coloration.

Bratyna nigricollis n. sp. [Hét.]. Niger, pectore, femoribus ad basin elytrisque rufis, his apice, externe longiore, nigris. Long. 6 mill. Gabon. — Diffère, à première vue, de *apicalis* W. par le thorax foncé.

Macrocistela n. g. [Hét.]. Corpus elongatus, supra fere glaber ; capite elongato ; thorace anguste marginato, non transverso, antice truncato ; elytris elongatis, thorace distincte latioribus ; mandibulis unidentatis ; articulo ultimo palparum max. elongato, intus arcuato ; articulo penultimo tarsorum longe lobato. Ce genre, établi pour l'espèce nouvelle suivante, se distingue, à première vue, de *Falsopsilonycha* Pic par le thorax bien plus étroit que les élytres.

M. striata n. sp. Elongatus, subopacus, parum pubescens, niger, thorace elytrisq. luteo-rufis, his apice nigris, sutura pro parte nigra; capite fortiter et dense punctato; thorace antice attenuato, sparse pupillato punctato; elytris elongatis, postice attenuatis, fortiter striato punctatis, intervallis subconvexis. Long. 13 mill. Congo.

Trachelolagria n. g. [Hét.]. Corpus elongatus; antennis gracilibus, parum elongatis; capite thorace latiore, illo elongato et angustato, lateraliter tuberculato; elytris thorace paulo latoribus, elongatis et parallelis, supra paulo inæqualibus; pedibus gracilibus. Ce nouveau genre a le faciès de *Trachelostenus* Sol., avec une tête plus large, le thorax tout autre, les élytres autrement sculptés; il est établi pour l'espèce suivante.

T. angustata n. sp. Angustatus, nitidus, breve griseo pubescens et longiore hirsutus, rufo metallicus, diverse brunnescens, palpis, antennis tarsisque testaceis; elytris brunneo-metallicis, luteo tessellatis, his diverse et paulo impressis, minute irregulariter punctatis. Long. 7 mill. Chine.

Heterogria forticornis n. sp. [Hét.]. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, capite thoraceque pro majore parte nigro-subæneis, antennis testaceis, articulis 4 ultimis piceis et latis, pedibus, femoribus ad basin pallidioribus, capite thoraceque brunneis, paulo alutaceis, minute punctatis; elytris parum latis et elongatis, striato punctatis, intervallis fere impunctatis. Long. 5 mill. Cameroun. — Espèce caractérisée par ses antennes à derniers articles très élargis.

Leptura (Vadonia) saucia v. nov. **Beckeri** [Cér.]. Elytris nigris, lateraliter, apice excepto, late rubris, ad humeros et ad medium in disco nigro maculatis. Sarepta.

Vadonia Steveni v. n. sareptana. Elytris rufo-luteis, ad suturam, antice paulo latiore, nigro marginatis et in disco ad medium nigro maculatis. Sarepta. — Caractérisée par le sommet des élytres, sauf bordure apicale rembrunie, roux. La var. *bilitigiosa* mihi (= *litigiosa* Plav. nec Muls.), a la pubescence de l'avant-corps foncée et la bande suturale étroite.

Pidonia lurida v. n. notaticollis. Thorace nigro, in medio supra diverse rufo, capite diverse rufo et nigro. Chartreuse (Pic).

Cryptocephalus bidens v. n. semilimbaticollis [Phyt.]. Thorace violaceo, lateraliter viride limbato, elytris viridibus. Salonique.

Orsodacna lineola v. n. innotatipennis [Phyt.]. Capite thoraceque rufo brunneis, elytris luteis, membris pro majore parte testaceis. Allemagne.

O. lineola v. n. luteoapicalis. Capite thoraceque rufescentibus, pro parte iridescentibus, elytris piceis, ad humeros luteo lineatis et apice luteo notatis. Eubée.

Oncocephala incisa n. sp. [Phyt.]. Oblongo-subovatus, elytris lateraliter paulo incisis, niger, tuberculo frontale et tuberculis thoracis rufis, elytris pro majore parte rufo marginatis, diverse sculptis, tibiis pro parte rufis. Long. 4 mill. Madagascar. — Diffère de *Perrieri* Frm. par la forme des élytres, l'absence de macule rousse basale sur ces organes.

O. Madoni n. sp. Oblongus, subcuneiformis, niger, paulo rufo notatus, pedibus rufescentibus ; elytris lateraliter fere rectis, diverse sculptis, costa prima diverse 4-nodosa. Long. 4,5 mill. Gabon. — Voisin du précédent avec les élytres différents.

O. ruficornis n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo

laticor, supra rufus, elytris nigro variegatis, infra corpore nigro, femoribus brunneo notatis ; elytris diverse sculptis, costa prima diverse 5-nodosa. Long. 6 mill. Afr. Or. — Voisin de *senegalensis* Guer., mais antennes entièrement claires.

Agonia lineaticollis n. sp. [Phyt.]. Elongatus, nitidus, testaceus, paulo rubro tinctus, thorace in disco nigro bilineato ; elytris in singulo longitudinaliter, in costa prima, nigro trinotatis, in costa discoidalis nigro binotatis. Long. 5 mill. Congo. — Diffère au moins de *interrupta* Duv. par le thorax orné de deux bandes foncées.

Lema bisbisignata n. sp. [Phyt.]. Oblongus, rufus, pectore pro parte, antennis, articulo 1° excepto, pedibusque, femoribus ad basin exceptis, nigris, elytris in disco ante et post medium nigro maculatis ; thorace sat breve, medio constricto ; elytris parum fortiter lineato punctatis, antice impressis. Long. 5 mil. Mexique. — Peut se placer près de *humerosignata* Pic.

L. discosignata n. sp., du Mexique, voisin du précédent, mais avec le dessous du corps entièrement roux, a le 2° article des antennes rougeâtre et une seule macule antérieure noire sur chaque élytre.

L. basifemoralis n. sp. Oblongus, nitidus, niger, pro parte viridescens, elytris viride-metallicis, capite postice, thorace femoribusque ad basin rufis. Long. 4 mill. Mexique. — Voisin de *pudens* Lac., s'en distingue à première vue par la base des cuisses rousse.

L. filicornis n. sp., du Mexique, voisin du précédent, est roux avec les élytres bleus, les antennes sont noires avec le 1^{er} article roux, les pattes sont rouges, avec les tibias en partie et les tarses foncés.

M. PIC.



SciELO/MZUSP